

Кефен
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий безбарвний розчин.

Склад

1 мл препарату містить активної речовини (мг):
кетопрофен 100,0

Допоміжні речовини: пропіленгліколь, етанол, бензанол, вода апірогенна.

Фармакологічні властивості

Кефен — нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП) із вираженою болетамувальною та жарознижувальною діями. Кетопрофен — це препарат групи карбонових кислот, похідних пропіонової кислоти. Механізм його дії полягає в інгібуванні синтезу простагландинів і тромбоксану та базується на порушенні метаболізму арахідонової кислоти. У терапевтичних дозах кетопрофен інгібує переважно ЦОГ-II і частково ЦОГ-I, забезпечуючи протизапальну, знеболювальну, жарознижувальну та протиендотоксичну дію. Після одноразового внутрішньом'язового введення максимальна концентрація кетопрофену в плазмі крові досягає через 30 хвилин. Кетопрофен із організму виводиться переважно через нирки.

Застосування

Препарат застосовують для лікування великої рогатої худоби, свиней і коней при гострому або хронічному перебігу запальних процесів опорно-рухового апарату (артрити, артрози, бурсити, вивихи, набряки, тендовагініти, травми, інфекційні ураження копит), респіраторних шляхів, синдрому метрит-мастит-агалактіа, різних форм маститу, для терапії больового синдрому різної етіології (після операцій, травм, при кольках), як жарознижувальний засіб при захворюваннях, які супроводжуються гіпертермією і пригніченим станом.

Дозування

Препарат застосовують внутрішньом'язово або внутрішньовенно у дозах:

велика рогата худоба

внутрішньом'язово або внутрішньовенно 1 раз на добу з розрахунку 0,3 мл препарату на 10 кг маси тіла впродовж 1-3 діб;

спортивні коні

внутрішньовенно 1 раз на добу з розрахунку 1 мл препарату на 45 кг маси тіла впродовж 3-5 діб. Для лікування тварини при кольках достатньо одноразового введення. За необхідності повторна ін'єкція можлива лише за умови додаткового обстеження тварини;

свині

внутрішньом'язово 1 раз на добу з розрахунку 0,3 мл препарату на 10 кг маси тіла впродовж 1-3 діб.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату.

Не застосовувати тваринам із виразкою шлунку або дванадцятипалої кишки, геморагічним синдромом, вираженою нирковою або печінковою недостатністю.

Не застосовувати одночасно з іншими НПЗП, глюкокортикоїдами, антикоагулянтами і діуретиками.

Застереження

Не вводити в одне місце більше 10 мл препарату.

Не змішувати з іншими препаратами в одному шприці.

Період виведення (каренції)

М'ясо свиней, призначене для споживання людям, використовують через 4 доби, м'ясо великої рогатої худоби — через 5 діб після застосування препарату. До зазначеного терміну продукцію утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, відповідно до висновку лікаря ветеринарної

медицини.

Для молока період виведення відсутній.

Форма випуску

Розчин у флаконах із оранжевого скла або поліпропілену, які закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10, 20, 50, 100, 200 і 400 мл.

Зберігання

У сухому темному місці в упакованні виробника за температури від 4° до 25° С.

Термін придатності — 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник готового продукту

ТОВ "Бровафарма®"

б-р Незалежності 18 а, м. Бровари, Київської обл., 07400, Україна